

LED- OG KNOGLELIDELSER HOS HUNDE OG KATTE

Forekomst, symptomer og betydningen af røntgenundersøgelse

Led- og knoglelidelser er blandt de hyppigste årsager til kroniske smerter og nedsat livskvalitet hos både hunde og katte. Tilstandene kan ramme dyr i alle aldre, men ses især hos ældre dyr, større racer og dyr med arvelig disposition.

Hyppige lidelser

De mest almindelige led- og knoglelidelser omfatter blandt andet:

- **Gigt (artrose/osteoartrose)**
En kronisk fremadskridende nedbrydning af leddenes brusk, ofte ledsaget af inflammation og smerte.
Ses hyppigst hos ældre hunde og katte.
- **Spondylose**
Forkalkninger og knoglenyddannelser langs rygsøjlen, som kan give stivhed og smerte.
Ses hyppigst hos ældre hunde og katte, men kan også forekomme hos yngre dyr.
- **Dysplasi (f.eks. hofte- og albuedysplasi)**
En udviklingslidelse, hvor leddet ikke passer optimalt sammen, hvilket medfører unormal belastning og senere gigtudvikling.
Hofte- og albuedysplasi ses hyppigst hos hunde, især større racer, men kan også forekomme hos katte.

Kliniske tegn – hvad kan du som ejer opleve

Tegn på led- og knoglelidelser kan variere men omfatter ofte:

- **Stivhed**, især efter hvile eller om morgenen
- **Tøven** inden spring eller inden der går på trapper
- **Modvilje** til at springe, lege eller gå på trapper
- **Nedsat aktivitetsniveau**
- **Ændret adfærd** (hos katte f.eks. ændret brug af kattebakke, mindre soignering eller tilbagetrukken adfærd).
- **Halthed** eller ujævn gang
- **Smertereaktion** ved berøring eller bevægelse

Dyr er generelt gode til at skjule smerte og ubehag, og det opleves derfor ofte, at symptomerne kommer snigende og langsomt forværres over tid.

Hvorfor anbefales røntgenundersøgelse?

Røntgen er et vigtigt redskab i udredning af led- og knoglelidelse fordi:

- Det giver et **detaljeret billede af hvilke strukturelle forandringer** der er i led og knogler. Både hunde og katte kan være gode til at skjule smerte og ubehag, hvilket kan gøre det svært at give en nøjagtig vurdering af smertens ophav og sværhedsgrad ved klinisk undersøgelse alene.
- Det kan bruges til at **vurdere sygdommens omfang og sværhedsgrad**.
- Det danner **grundlag for en målrettet behandlings- og smerteplan**.
- Dette kan bruges til at **vurdere behov/ mulighed for kirurgisk behandling**.
- Det gør det muligt at **følge udviklingen over tid** og vurdere eventuelle behov for justering i behandlingen.
- Det kan **bekræfte eller afkræfte mistanke** om gigt, dysplasi, spondylose eller andre forandringer.

Tidlig diagnose giver bedre livskvalitet

Ikke alle led- og knoglelidelser kan helbredes fuldstændigt, men kan tidlig diagnose og korrekt behandling kan gøre en stor forskel. Med den rette kombination af smertelindring, vægtkontrol, tilpasset motion samt korrekt foder og eventuelle kosttilskud, kan mange dyr opretholde en god livskvalitet i mange år.

Har du mistanke om, at dit kæledyr har smerter eller bevægelsesproblemer, anbefaler vi at du kontakter os på **telefon 56 28 61 68** og får tid til en klinisk undersøgelse. Vi hjælper så med at finde problemet og skræddersyr den rette behandling til netop dit kæledyr.